核准日期：2019年05月28日
修改日期：2019年12月24日
修改日期：2020年07月10日
修改日期：2020年12月30日
修改日期：2024年08月14日
修改日期：2025年10月01日

力恩普®
Lean&Leap

阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂说明书（简化版）

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本说明书为简化版说明书，如您想了解药物最新完整的信息，请详见电子版（可通过微信扫描左上方二维码）

【药品名称】通用名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂

【成　　份】本品为复方制剂，每瓶含：

（1）阿莫西林2.0g和克拉维酸钾0.285g，临用前用水配制成50ml混悬液。

（2）阿莫西林4.0g和克拉维酸钾0.57g，临用前用水配制成50ml混悬液。

【性　　状】本品为白色至淡黄色粉末或细颗粒；气芳香。

【适 应 症】本品用于治疗如下条件中指明的微生物的敏感菌株引起的感染：

1.下呼吸道感染：由产生β-内酰胺酶菌的嗜血杆菌或摩拉克菌引起。

2.中耳炎：由产生β-内酰胺酶菌的嗜血杆菌或摩拉克菌引起。

3.窦炎：由β-内酰胺酶产生菌嗜血杆菌或摩拉克菌引起。

4.皮肤及皮肤软组织感染：由产生β-内酰胺酶的葡萄球菌、大肠杆菌或克雷白杆菌引起。

5.尿路感染：由大肠杆菌、克雷白杆菌或肠杆菌引起。

尽管本品对以上各种感染有效，但由氨苄青霉素敏感菌引起的感染也可用本品治疗，其原因是本品含有阿莫西林成分。因此对氨苄青霉素敏感的微生物和产生β-内酰胺酶的微生物引发的复合感染均对本品敏感，不需要再另用其它的抗生素。因为阿莫西林在体外对肺炎链球菌比氨苄青霉素和青霉素更有效，因此对氨苄青霉素或青霉素中敏感的绝大多数的肺炎链球菌对阿莫西林和本品是完全敏感的。

为检测致病菌及其对本品的敏感性，应和外科手术一起进行细菌学试验。当感染可能涉及上述的产生β-内酰胺酶的微生物，通过细菌学和敏感试验得到结果前须开始治疗，以便测得致病菌和其对本品的敏感性。一旦知道结果，如需要，应及时调整治疗方案。

【规　　格】

（1）阿莫西林（$C_{16}H_{19}N_3O_5S$）2.0g和克拉维酸钾（$C_8H_9NO_5$）0.285g；

（2）阿莫西林（$C_{16}H_{19}N_3O_5S$）4.0g和克拉维酸钾（$C_8H_9NO_5$）0.57g。

【用法用量】

口服，取本品适量，置于适量温开水中，搅拌至完全溶解后服用。

成人及体重大于40kg(或年龄大于12岁)的儿童，根据病情的需要，每次5～10ml(457mg/5ml)或10～20ml(228.5mg/5ml)，每12小时一次。或遵医嘱。

体重小于40kg(或年龄小于12岁)的儿童，建议的剂量如下：

1)对于7～12岁的儿童，每次3.75ml(457mg/5ml)或7.5ml(228.5mg/5ml)，每12小时一次。或遵医嘱。

2)对于2～7岁的儿童，每次2.5ml(457mg/5ml)或5ml(228.5mg/5ml)，每12小时一次。或遵医嘱。

3)对于9月～2岁的儿童，每次1.25ml(228.5mg/5ml)，每12小时一次。或遵医嘱。

对于肾功能受损患者：肾功能受损的病人一般不要求减少剂量；严重肾功能受损的病人，肌酐清除率＜30ml/min者，不应服用本品。

对于肝功能受损患者：应慎用本品，并且应定期检查肝功能。

【禁　　忌】

1.青霉素皮试阳性反应者、对本品及其他青霉素类药物过敏者及传染性单核细胞增多症患者禁用。

2.曾经出现过阿莫西林克拉维酸钾相关胆汁淤积或肝功能损伤的患者禁用。

【贮　　藏】本品干粉应置于密封，凉暗干燥处(不超过20℃)保存。已加水调配后的混悬液应置于冰箱(2～8℃)中保存，并应在10天内用完，请将超过保存期的药液抛弃。

【药品上市许可持有人】

名　　称：中山市力恩普制药有限公司

电话号码：0760-87983063 87983062

传真号码：0760-22836326

网　　址：www.leppharma.com

如有问题可与药品上市许可持有人联系或通过网址反馈药品不良反应信息